



OBSERVATIONER ÖVER VADARFÖREKOMSTEN VID
FABRIKSDAMMarna I HASLARP ÅR 1969.


Följande sammanställning av vadarförekomsten på sockerbruks-dammarna i Hasslarp bygger på drygt 100 observationstillfällen.

Dessa är ganska jämnt fördelade över våren, sommaren och hösten, med undantag av två veckor i mitten på augusti.

Förhållandena har varit mycket skiftande. Våren bjöd på ganska klen vadarförekomst, beroende på det alltför höga vattenståndet i dammarna. De bästa perioderna inföll dels i juli och början av augusti, dels i början av september. Under dessa perioder rastade förhållandevis stora mängder vadare på området.

Materialet bygger så gott som uteslutande helt på egna observationer, som sammanställts art för art. Allt som allt sågs 24 arter under året. Rödspoven var den enda tidigare sedda arten, som ej iakttogs 1969.

-BB-



OBSERVATIONER ÖVER VADARFÖREKOMSTEN VID FABRIKSDAMMarna
I HASSLARP ÅR 1969.

Följande sammanställning av vadarförekomsten på sockerbruksdammarna i Hasslarp bygger på drygt 100 observationstillfällen. Dessa är ganska jämnt fördelade över våren, sommaren och hösten, med undantag av två veckor i mitten på augusti, som tillbringades i Falsterbo.

Förhållandena har varit mycket skiftande. Våren bjöd på ganska klen vadarförekomst, beroende på det alltför höga vattenståndet i dammarna. De bästa perioderna inföll dels i juli och början av augusti, dels i början av september. Under dessa perioder rastade förhållandevis stora mängder vadare på området.

Materialet bygger så gott som helt uteslutande på egna observationer, som sammanställts art för art. Allt som allt sågs 24 arter under året. Rödspoven var den enda tidigare sedda arten, som ej iakttogs 1969.

Beskrivningar av de olika arterna eller försök till analys av deras uppträdande har inte gjorts.

STRANDSKATA

Endast enstaka observationer.

27.4 2 ex.

14.5 2 ex.

4.6 2 ex.

8.6 2 ex.

22.6 4 ex.

24.6 2 ex.

25.6 4 ex.

4.7 1 ex.

7.7 2 ex.

9.7 3 ex.

13.7 1 ex.

Inga observationer 1968.

TOFSVIPA

Den 7.3 sågs de första tofsviporna. 7 ex. sträckte över området i nordlig riktning. Flera sporadiska observationer följde under mitten av mars. I slutet av månaden ökade antalet, och från de sista dagarna i mars till början av juli var mellan 40 och 50 tofsvipor stationära inom området, bortsett från de ungfåglar som tillkom.

C:a 15 bon hittades. Några av dessa blev dock på ett eller annat sätt plundrade.

Antalet tofsvipor under sensommaren skiftade kraftigt. I augusti, september och oktober fanns dock för det mesta mellan 200 och 400 ex. i de rastande flockarna, som ofta var blandade med ljungpipare. Den sista flocken iakttoptes den 21.11 då c:a 800 ex. rastade på åkrarna söder om Grönvik.

Under våren 1968 hittades c:a 30 vipbon. Minskningen 1969 berodde på det höga vattenståndet i dammarna under häckningstiden.

STÖRRE STRANDPIPARE

Sågs regelbundet, oftast i litet antal, under våren och sommaren.

4.4 2 ex.

15.4 1 ex.

19.5 1 ex.

22.5 1 ex.

31.5 1 ex.

16.6 1 ex.

22.6	12 ex.
24.6	1 ex.
25.6	1 ex.
27.6	1 ex.
29.6	1 ex.
4.7	2 ex.
5.7	5 ex.
7.7	3 ex.
9.7	2 ex.
10.7	1 ex.
11.7	1 ex.
12.7	5 ex.
13.7	4 ex.
14.7	2 ex.
16.7	5 ex.
17.7	1 ex.
20.7	1 ex.
5.8	1 ex.
7.8	1 ex.
8.8	1 ex.
9.8	4 ex.
24.8	1 ex.
27.8	4 ex.
29.8	8 ex.
30.8	3 ex.
1.9	3 ex.
17.9	1 ex.

MINDRE STRANDPIPARE

Sågs regelbundet under våren och sommaren, dock i något större antal än föregående.

8.4	1 ex.
20.4	1 ex.
25.4	1 ex.
29.4	1 ex.
14.5	1 ex.
16.6	1 ex.

22.6 1 ex.
24.6 2 ex.
25.6 1 ex.
28.6 1 ex.
29.6 2 ex.
1.7 1 ex.
4.7 4 ex.
5.7 2 ex.
6.7 3 ex.
7.7 4 ex.
8.7 2 ex.
9.7 5 ex.
10.7 9 ex.
11.7 6 ex.
12.7 4 ex.
13.7 7 ex.
14.7 6 ex.
17.7 14 ex.
18.7 15 ex.
20.7 4 ex.
24.7 3 ex.
25.7 1 ex.
26.7 1 ex.
4.8 10 ex.
5.8 4 ex.
7.8 4 ex.
8.8 5 ex.
9.8 9 ex.
24.8 1 ex.
27.8 2 ex.
30.8 2 ex.
1.9 1 ex.
3.9 1 ex.

(KUSTPIPARE
Tillfälligt gäst.
4.4 3 ex.)

22

LJUNGPIPARE

Endast en vårobservation.

28.4 18 ex.

Sågs regelbundet under eftersommaren och hösten, periodvis i ganska stort antal.

20.7 2 ex.

21.7 c:a 25 ex.

24.7 5 ex.

6.8 3 ex.

8.8 2 ex.

24.8 18 ex.

27.8 1 ex.

28.8 c:a 150 ex.

30.8 1 ex.

2.9 c:a 400 ex.

4.9 c:a 200 ex.

13.9 c:a 75 ex.

16.9 2 ex.

4.10 9 ex.

25.10 c:a 300 ex.

7.11 c:a 50 ex.

19-21.11 c:a 900 ex.

ENKELBECKASIN

Fåtalig under vårsträcket.

1.4 1 ex.

4.4 1 ex.

6.4 5 ex.

9.4 2 ex.

11.4 1 ex.

15.4 4 ex.

20.4 1 ex.

25.4 2 ex.

19.5 1 ex.

Inga observationer under juni månad, vilket också var fallet 1968.

Regelbunden under sommaren och hösten, speciellt individrik i augusti och september.

7.7 1 ex

9.7	2 ex.
10.7	4 ex.
13.7	3 ex.
14.7	1 ex.
16.7	3 ex.
17.7	5 ex.
24.7	2 ex.
25.7	7 ex.
26.7	10 ex.
4.8	c:a 20 ex.
5.8	c:a 15 ex.
6.8	c:a 15 ex.
7.8	c:a 10 ex.
8.8	c:a 15 ex.
24.8	c:a 30 ex.
27.8	c:a 25 ex.
28.8	c:a 20 ex.
29.8	c:a 25 ex.
30.8	c:a 20 ex.
1.9	c:a 30 ex.
2.9	c:a 45 ex.
6.9	c:a 15 ex.
13.9	c:a 35 ex.
16.9	c:a 60 ex.
17.9	c:a 30 ex.
18.9	c:a 40 ex.
21.9	c:a 30 ex.
27.9	c:a 15 ex.
28.9	5 ex.
30.9	1 ex.
3.10	5 ex.
4.10	3 ex.
6.10	5 ex.
15.10	7 ex.
7.11	3 ex.

DUBBELBECKASIN

Tillfällig gäst.

3.10 1 ex.

STORSPOV

Sporadiska iakttagelser under vårsträcket.

4.4 1 ex. (nordsträckande)
20.4 58 ex. (Enl. T.Terne)

SMÅSPOV

Rastade tillfälligt under sydsträcket.

13.7 1 ex.
26.7 1 ex.

SKOGSSNÄPPA

Endast fyra vårobservationer.

8.4 1 ex.
9.4 3 ex.
25.4 1 ex.
27.4 1 ex.

Sågs regelbundet, fast fåtaligt, under hela sommaren.

22.6 3 ex.
24.6 1 ex.
25.6 1 ex.
30.6 2 ex.
4.7 1 ex.
5.7 3 ex.
8.7 1 ex.
9.7 4 ex.
10.7 5 ex.
12.7 3 ex.
13.7 3 ex.
14.7 2 ex.
16.7 2 ex.
17.7 2 ex.
18.7 2 ex.
25.7 2 ex.

5.8 3 ex.

8.8 5 ex.

En höstobservation.

6.9 1 ex.

GRÖNBENA

Få vårobservationer.

18.5 1 ex.

19.5 3 ex.

20.5 3 ex.

21.5 1 ex.

Regelbunden, ofta i stort antal, under sommaren och förhösten.

12.6 1 ex.

15.6 2 ex.

22.6 6 ex.

25.6 4 ex.

27.6 24 ex.

28.6 20 ex.

29.6 6 ex.

30.6 6 ex.

1.7 7 ex.

2.7 10 ex.

4.7 10 ex.

5.7 9 ex.

6.7 12 ex.

7.7 16 ex.

8.7 c:a 15 ex.

9.7 c:a 20 ex.

10.7 c:a 15 ex.

11.7 c:a 10 ex.

12.7 c:a 25 ex.

13.7 c:a 30 ex.

16.7 c:a 15 ex.

17.7 c:a 30 ex.

18.7 c:a 20 ex.

24.7 c:a 20 ex.

5.8 c:a 40 ex.
7.8 c:a 20 ex.
8.8 c:a 20 ex.
9.8 c:a 25 ex.
24.8 c:a 20 ex.
27.8 c:a 30 ex.
28.8 c:a 25 ex.
29.8 c:a 15 ex.
30.8 c:a 15 ex.
1.9 c:a 20 ex.
2.9 c:a 25 ex.
6.9 c:a 10 ex.
13.9 c:a 10 ex.
17.9 - 1.10 1 ex.

DRILLSNÄPPA

Regelbunden under våren, dock i litet antal.

25.4 1 ex.
27.4 2 ex.
28.4 1 ex.
30.4 1 ex.
10.5 1 ex.
16.5 2 ex.
18.5 2 ex.
19.5 2 ex.
20.5 4 ex.
21.5 2 ex.
22.5 2 ex.

31.5 2 ex. Denna dag stöttes en av fåglarna helt oväntat upp från ett bo innehållande 4 ägg. Boet var olyckligtvis placerat intill den av dammarna, som under våren och sommaren tömdes på slam, och de närmaste dagarna efter upptäckten kom den grävmaskin, som arbetade med detta, att befinna sig endast några meter från boet. Den 5.6 hittades boet övergivet, höljt under en stor dynklump, och båda föräldrarna var försvunna.

Sågs regelbundet även under sommaren och hösten, periodvis i förhållandevis stort antal.

28.6	2 ex.
1.7	1 ex.
5.7	2 ex.
6.7	8 ex.
7.7	6 ex.
8.7	4 ex.
9.7	5 ex.
10.7	4 ex.
12.7	3 ex.
13.7	5 ex.
14.7	3 ex.
16.7	2 ex.
17.7	6 ex.
18.7	7 ex.
24.7	4 ex.
25.7	14 ex.
26.7	10 ex.
4.8	5 ex.
5.8	10 ex.
7.8	10 ex.
8.8	10 ex.
9.8	4 ex.
24.8	1 ex.
27.8	15 ex.
28.8	5 ex.
30.8	5 ex.
2.9	6 ex.
6.9	3 ex.
13.9	9 ex.
27.9	1 ex.
4.10	1 ex.

RÖDBENA

Sågs regelbundet under våren och sommaren, oftast i litet antal. De största flockarna iakttogs i mitten av juli.

9.7	13 ex.
12.7	11 ex.
17.7	15 ex.

18.7 8 ex.

Ett bo med 4 ägg hittades i början av juli. Utgången oviss.

Endast enstaka exemplar sågs under hösten.

4 ex. den 6.9 utgjorde sista observationen för året.

SVARTSNÄPPA

En vårobservation.

11.5 1 ex.

Sågs sporadiskt under sommaren och förhösten.

22.6 1 ex.

28.6 1 ex.

24.7 1 ex.

25.7 3 ex.

26.7 1 ex.

8.8 1 ex.

9.8 1 ex.

24.8 3 ex.

27.8 3 ex.

28.8 3 ex.

29.8 2 ex.

1.9 1 ex.

3.9 1 ex.

GLUTTSNÄPPA

Sporadisk under maj och juni.

8.5 2 ex.

14.5 1 ex.

3.6 1 ex.

28.6 1 ex.

Regelbunden under hela sommaren.

1.7 1 ex.

2.7 1 ex.

5.7 3 ex.

6.7 2 ex.

7.7 2 ex.

10.7	2 ex.
11.7	2 ex.
12.7	7 ex.
13.7	14 ex.
14.7	2 ex.
16.7	1 ex.
17.7	4 ex.
18.7	5 ex.
24.7	3 ex.
25.7	2 ex.
26.7	2 ex.
4.8	2 ex.
6.8	1 ex.
7.8	7 ex.
8.8	7 ex.
9.8	5 ex.
26.8	1 ex.
27.8	2 ex.
28.8	3 ex.
29.8	3 ex.
30.8	1 ex.

SMÅSNÄPPA

Ovanligt riklig förekomst i augusti och september.

(Detta noterades även på andra vadarlokaler, speciellt i inlandet, där i allmänhet endast enstaka småsnäppor ses.)

24.8	1 ex.
27.8	2 ex.
28.8	3 ex.
29.8	9 ex.
30.8	13 ex.
1.9	7 ex.
2.9	11 ex.
6.9	5 ex.
13.9	5 ex.
16.9	1 ex.
17.9	5 ex.
18.9	5 ex.
21.9	5 ex.

Inga observationer 1968.

SPOVSNÄPPA

En iakttagelse i juli.

13.7 2 ex. i sommardräkt.

Invasionsartad förekomst i månadsskiftet augusti-september, speciellt påtagbar i inlandet, där det vid normala förhållanden ses endast mycket små flockar av spovsnäppa.

24.8 3 ex.

27.8 20 ex.

28.8 17 ex.

29.8 c:a 35 ex.

30.8 36 ex.

1.9 c:a 20 ex.

2.9 c:a 40 ex.

3.9 28.ex.

6.9 c:a 15 ex.

1 ex. den 2.6 utgjorde enda observationen 1968.

MYRSNÄPPA

Tillfällig gäst.

2.10 1 ex. i vinterdräkt.

2

BRUSHANE

Sporadisk under våren.

8.5 2 ex.

12.5 3 ex.

2.6 2 ex.

Regelbunden, periodvis i stort antal, under sommaren och förhösten. Spel i mindre omfattning förekom i månadsskiftet juni-juli.

27.6 23 ex.

28.6 c:a 40 ex.

29.6 12 ex.

30.6 c:a 20 ex.

1.7 c:a 10 ex.

2.7 c:a 15 ex.

4.7 c:a 15 ex.

5.7 11 ex.
6.7 1 ex.
7.7 1 ex.
8.7 3 ex.
9.7 2 ex.
11.7 1 ex.
12.7 11 ex.
13.7 13 ex.
17.7 c:a 15 ex.
18.7 12 ex.
20.7 c:a 15 ex.
24.7 27 ex.
25.7 c:a 30 ex.
26.7 c:a 25 ex.
4.8 c:a 50 ex.
5.8 c:a 50 ex.
6.8 c:a 40 ex.
7.8 c:a 30 ex.
8.8 c:a 30 ex.
9.8 c:a 30 ex.
24.8 c:a 30 ex.
27.8 3 ex.
28.8 c:a 30 ex.
29.8 c:a 20 ex.
30.8 c:a 10 ex.
1.9 c:a 20 ex.
2.9 c:a 10 ex.
3.9 c:a 15 ex.
6.9 c:a 10 ex.
16.9 10 ex.
17.9 2 ex.
18.9 c:a 15 ex.
21.9 c:a 20 ex.
27.9 2 ex.
28.9 8 ex.

SKÄRFLÄCKA

Sågs regelbundet från början av maj till början av augusti, mot slutet av denna period i för en inlandslokal anmärkningsvärt stort antal.

- 9.5 2 ex.
10.5 4 ex.
11.5 5 ex.
14.5 6 ex. 1 bo med 4 ägg hittat på ett sädesfält strax söder om dammarna. En av fåglarna sågs ruva redan den 11.5.
15.5 7 ex.
16.5 10 ex.
18.5 8 ex. Ytterligare 2 bon hittade. Det ena var placerat på ovan nämnda fält, några tiotal meter från det första boet, det andra låg i den största dammen. Båda bona innehöll 4 ägg.
19.5 8 ex.
20.5 7 ex.
21.5 6 ex.
22.5 6 ex.
30.5 6 ex.
3.6 8 ex.
5.6 7 ex.
8.6 5 ex. 2 av bona övergivna förmodligen beroende på besprutningen av sädesfältet.
9.6 4 ex. 4 ungar tryckte i närheten av det återstående boet, som alltså nu var tomt.
16.6 4 ex.
22.6 4 ex.
25.6 7 ex.
26.6-1.7 2 ex.
2.7 10 ex.
4.7 10 ex. (3 juv.)
5.7 12 ex.
9.7 12 ex. (2 juv.)
10-12.7 4 ex. -(2 juv.)
13.7 7 ex.
18.7 15 ex.
20.7 8 ex.
25.7 7 ex.

26.7 9 ex.
5.8 19 ex.
6.8 20 ex.
7.8 23 ex.
8.8 22 ex.
9.8 23 ex.

1968 häckade endast ett par skärfläckor på området. 2 ungar
blev flygga.

I övrigt likartade iakttagelser.

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA

Tillfällig gäst.

27 - 29.8 1 ex. i vinterdräkt.

1968 rastade 2 ex. på området den 25 - 27.5. Båda var i som-
mardräkt.